

## Алпизарин



### Код АТХ:

- [J05AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь для наружного и местного применения** однородная, светло-желтого цвета, с зеленоватым оттенком или без оттенка.

	<b>100 г</b>
тетрагидроксиглюкопиранозилксантен	2 г

*Вспомогательные вещества:* вазелин медицинский до получения 100 г мази.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

**Мазь для наружного и местного применения** однородная, светло-желтого цвета, с зеленоватым оттенком или без оттенка.

	<b>100 г</b>
тетрагидроксиглюкопиранозилксантен	5 г

*Вспомогательные вещества:* вазелин медицинский до получения 100 г мази.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ингибирующее действие препарата на репродукцию вируса особенно проявляется на ранних этапах его развития.

Алпизарин обладает иммуностимулирующими свойствами в отношении клеточного и гуморального иммунитета, способностью индуцировать продукцию гамма-интерферона в клетках крови.

Алпизарин ингибирует рост грамотрицательных (*Escherichia coli*) и грамположительных (*Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis*) бактерий, грибов (*Microsporum canis*) и простейших паразитов (*Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis*). В основе механизма действия препарата лежит способность подавления активности бактериальной нуклеазы.

Алпизарин обладает противовоспалительным (противоотечным) действием.

### Фармакокинетика

При наружном и/или местном применении Алпизарин не оказывает существенного системного действия.

## Показания к применению:

— взрослым и детям старше 1 года в комплексной терапии острых и рецидивирующих форм заболеваний, вызванных вирусом герпеса (*Herpes simplex* и *Herpes zoster*) различной локализации (в том числе генитальной), вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит, красный плоский лишай), опоясывающего лишая, герпетиформной экземы Капоши, цитомегаловирусной инфекции, ветряной оспы.

## Относится к болезням:

- [Ветрянка](#)
- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Стоматит](#)
- [Цитомегаловирусная инфекция](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- беременность;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* период лактации (грудного вскармливания).

## Способ применения и дозы:

Наружно, местно.

Мазь применяют наружно/местно 4-6 раз в сутки: на кожные поражения взрослым назначают 5 % мазь, детям - 2 %; на слизистые оболочки взрослым и детям - 2% мазь. Мазь наносят тонким слоем и слегка втирают.

Терапевтический эффект препарата наиболее выражен при его назначении в начальном периоде заболевания или рецидива. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания:

При *острых и рецидивирующих формах простого герпеса экстрагенитальной локализации* при единичных высыпаниях мазь наносят на очаг поражения в течение 3-5 дней. В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфаденопатии и других общих явлениях мазь применяют в течение 5-14 дней.

При *герпетиформной экземе Капоши и цитомегаловирусной инфекции* мазь применяют в тех же возрастных дозировках в течение 7-21 дня в комплексной терапии.

При *генитальном герпесе* 2 % мазь наносят на пораженные участки от 4 до 6 раз в сутки в течение 7-10 дней.

При *вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит)* мазь наносят на пораженные участки в течение 5-15 дней, при эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта - в течение 2-4 недель.

При *заболеваниях, вызываемых Herpes zoster (опоясывающий лишай) и Varicella zoster (ветряная оспа)* местно

## **Алпизарин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

применяют мазь 2 % (детям) или 5 % (взрослым) на очаг поражения в течение 5-21 дня.

При рецидивах проводят повторные курсы лечения препаратом.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка:**

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано при беременности. С осторожностью в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При наружном использовании препарата взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено. Препарат может применяться в комплексном лечении, в том числе с препаратами системного (общерезорбтивного) действия.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Ингибирующее действие препарата на репродукцию вируса особенно проявляется на ранних этапах его развития.

В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфоаденопатии и других общих явлениях в комплексе с мазью для местного и наружного применения применяют Алпизарин в таблетках.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и/или оператора).

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 1 года. Возможно применение у детей старше 1 года по показаниям.

### **Условия хранения:**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 12 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Alpizarin>