Алпизарин



Код АТХ:

- J05AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного и местного применения однородная, светло-желтого цвета, с зеленоватым оттенком или без оттенка.

	100 г
тетрагидроксиглюкопиранозилксантен	2 г

Вспомогательные вещества: вазелин медицинский до получения 100 г мази.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Мазь для наружного и местного применения однородная, светло-желтого цвета, с зеленоватым оттенком или без оттенка.

	100 г
тетрагидроксиглюкопиранозилксантен	5 г

Вспомогательные вещества: вазелин медицинский до получения 100 г мази.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ингибирующее действие препарата на репродукцию вируса особенно проявляется на ранних этапах его развития.

Алпизарин обладает иммуностимулирующими свойствами в отношении клеточного и гуморального иммунитета, способностью индуцировать продукцию гамма-интерферона в клетках крови.

Алпизарин ингибирует рост грамотрицательных (Escherichia coli) и грамположительных (Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis) бактерий, грибов (Microsporum canis) и простейших паразитов (Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis). В основе механизма действия препарата лежит способность подавления активности бактериальной нуклеазы.

Алпизарин обладает противовоспалительным (противоотечным) действием.

Фармакокинетика

При наружном и/или местном применении Алпизарин не оказывает существенного системного действия.

Показания к применению:

— взрослым и детям старше 1 года в комплексной терапии острых и рецидивирующих форм заболеваний, вызванных вирусом герпеса (Herpes simplex и Herpes zoster) различной локализации (в том числе генитальной), вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит, красный плоский лишай), опоясывающего лишая, герпетиформной экземы Капоши, цитомегаловирусной инфекции, ветряной оспы.

Относится к болезням:

- Ветрянка
- Герпес
- Инфекции
- Лишай
- Стоматит
- Цитомегаловирусная инфекция
- Экзема

Противопоказания:

— беременность;

— детский возраст до 1 года;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Наружно, местно.

Мазь применяют наружно/местно 4-6 раз в сутки: на кожные поражения взрослым назначают 5 % мазь, детям - 2 %; на слизистые оболочки взрослым и детям - 2% мазь. Мазь наносят тонким слоем и слегка втирают.

Терапевтический эффект препарата наиболее выражен при его назначении в начальном периоде заболевания или рецидива. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания:

При *острых и рецидивирующих формах простого герпеса экстрагенитальной локализации* при единичных высыпаниях мазь наносят на очаг поражения в течение 3-5 дней. В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфоаденопатии и других общих явлениях мазь применяют в течение 5-14 дней.

При *герпетиформной экземе Капоши и цитомегаловирусной инфекции* мазь применяют в тех же возрастных дозировках в течение 7-21 дня в комплексной терапии.

При *генитальном герпесе* 2 % мазь наносят на пораженные участки от 4 до б раз в сутки в течение 7-10 дней.

При *вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит)* мазь наносят на пораженные участки в течение 5-15 дней, при эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта - в течение 2-4 недель.

При *заболеваниях, вызываемых Herpes zoster (опоясывающий лишай) и Varicella zoster (ветряная оспа)* местно

применяют мазь 2 % (детям) или 5 % (взрослым) на очаг поражения в течение 5-21 дня.

При рецидивах проводят повторные курсы лечения препаратом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности. С осторожностью в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При наружном использовании препарата взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено. Препарат может применяться в комплексном лечении, в том числе с препаратами системного (общерезорбтивного) действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Ингибирующее действие препарата на репродукцию вируса особенно проявляется на ранних этапах его развития.

В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфоаденопатии и других общих явлениях в комплексе с мазью для местного и наружного применения применяют Алпизарин в таблетках.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и/или оператора).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 1 года. Возможно применение у детей старше 1 года по показаниям.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 12 до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Alpizarin