

Алтацид



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки жевательные** круглые, плоские с обеих сторон, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с гладкой поверхностью, с запахом ментола.

	1 таб.
высушенный гель алюминия гидроксида	333.3 мг,
соответствует алюминия гидроксиду	167.5 мг
магния оксид	158.4 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, тальк, повидон, макрогол 4000, мятный ароматизатор, магния стеарат, натрия сахарин.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

◇ **Суспензия для приема внутрь** белого цвета, с запахом ментола.

	5 мл
гель алюминия гидроксида 10%	2249.5 мг,
соответствует алюминия гидроксиду	225 мг
паста магния гидроксида 30%	425 мг,
соответствует магния гидроксиду	127.5 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол 70% (не кристаллический), метилпарагидроксibenзоат, мятный ароматизатор, пропилпарагидроксibenзоат, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антацидный препарат. Нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, понижает пептическую активность желудочного сока. Оказывает также адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшая воздействие повреждающих факторов на слизистую оболочку.

Показания к применению:

— острый гастрит;

— гиперацидный гастрит;

- острый дуоденит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- симптоматические язвы различного генеза;
- эрозии слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
- рефлюкс-эзофагит;
- острый панкреатит, обострение хронического панкреатита;
- гиперфосфатемия;
- боли в эпигастрии и изжога при погрешностях в диете, приеме лекарственных препаратов, избыточном употреблении кофе, алкоголя, никотина;
- бродильная и гнилостная диспепсия.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Диспепсия](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Панкреатит](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- хроническая почечная недостаточность;
- болезнь Альцгеймера;
- гипофосфатемия;
- беременность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 1-2 таб. или по 10-15 мл (2-3 чайные ложки) суспензии 4-6 раз/сут через 1 ч после еды и на ночь.

Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают половину дозы взрослых.

Таблетки следует тщательно разжевывать. Суспензию принимают с небольшим количеством воды или молока. Перед применением флакон с суспензией следует взболтать.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, запор.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении в высоких дозах - гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипермагниемия, гипералюминиемия.

Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении в высоких дозах - нефрокальциноз, нарушение функции почек.

Алтацид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Прочие: энцефалопатия; при сопутствующей почечной недостаточности - жажда, снижение АД, гипорефлексия.

Передозировка:

Длительное применение препарата в высоких дозах может привести к развитию дискинезии кишечника, гипофосфатемии, остеомаляции, а также к развитию дефицита железа в организме, т.к. алюминия фосфат связывает железо.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано назначение препарата при беременности.

В период лактации (грудного вскармливания) Алтацид следует применять с осторожностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с Алтацидом снижается и замедляется абсорбция индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, непрямым антикоагулянтов, барбитуратов.

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие Алтацида.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует соблюдать 2-часовой интервал между приемом Алтацида и других лекарственных средств.

При длительном приеме Алтацида следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора.

Использование в педиатрии

С осторожностью следует назначать Алтацид **детям в возрасте до 12 лет.**

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует назначать Алтацид **детям в возрасте до 12 лет.**

Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают половину дозы взрослых.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Altacid>