Алтацид



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** круглые, плоские с обеих сторон, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с гладкой поверхностью, с запахом ментола.

	1 таб.
высушенный гель алюминия гидроксида	333.3 мг,
соответствует алюминия гидроксиду	167.5 мг
магния оксид	158.4 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, тальк, повидон, макрогол 4000, мятный ароматизатор, магния стеарат, натрия сахарин.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

◊ ***Суспензия для приема внутрь*** белого цвета, с запахом ментола.

	5 мл
гель алюминия гидроксида 10%	2249.5 мг,
соответствует алюминия гидроксиду	225 мг
паста магния гидроксида 30%	425 мг,
соответствует магния гидроксиду	127.5 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол 70% (не кристаллический), метилпарагидроксибензоат, мятный ароматизатор, пропилпарагидроксибензоат, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антацидный препарат. Нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, понижает пептическую активность желудочного сока. Оказывает также адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшая воздействие повреждающих факторов на слизистую оболочку.

Показания к применению:

— острый гастрит;

— гиперацидный гастрит;

— острый дуоденит;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— симптоматические язвы различного генеза;

— эрозии слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ;

— грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;

— рефлюкс-эзофагит;

— острый панкреатит, обострение хронического панкреатита;

— гиперфосфатемия;

— боли в эпигастрии и изжога при погрешностях в диете, приеме лекарственных препаратов, избыточном употреблении кофе, алкоголя, никотина;

— бродильная и гнилостная диспепсия.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Грыжа
- Диспепсия
- Дуоденит
- Изжога
- Панкреатит
- Рефлюкс-эзофагит
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— хроническая почечная недостаточность;

— болезнь Альцгеймера;

— гипофосфатемия;

— беременность;

— повышенная чувствительнось к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 1-2 таб. или по 10-15 мл (2-3 чайные ложки) суспензии 4-6 раз/сут через 1 ч после еды и на ночь.

Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают половину дозы взрослых.

Таблетки следует тщательно разжевывать. Суспензию принимают с небольшим количеством воды или молока. Перед применением флакон с суспензией следует взболтать.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, запор.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении в высоких дозах - гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипермагниемия, гипералюминиемия.

Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении в высоких дозах - нефрокальциноз, нарушение функции почек.

Прочие: энцефалопатия; при сопутствующей почечной недостаточности - жажда, снижение АД, гипорефлексия.

Передозировка:

Длительное применение препарата в высоких дозах может привести к развитию дискинезии кишечника, гипофосфатемии, остеомаляции, а также к развитию дефицита железа в организме, т.к. алюминия фосфат связывает железо.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано назначение препарата при беременности.

В период лактации (грудного вскармливания) Алтацид следует применять с осторожностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с Алтацидом снижается и замедляется абсорбция индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых H_2-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов.

М-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие Алтацида.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует соблюдать 2-часовой интервал между приемом Алтацида и других лекарственных средств.

При длительном приеме Алтацида следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора.

Использование в педиатрии

С осторожностью следует назначать Алтацид **детям в возрасте до 12 лет.**

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует назначать Алтацид **детям в возрасте до 12 лет.**

Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают половину дозы взрослых.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Altacid