

[Алтайский эликсир](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Алтайский экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает адаптогенное, тонизирующее, мягкое стимулирующее и общеукрепляющее действие. Представляет собой водно-спиртовое извлечение из смеси 24 видов лекарственного растительного сырья.

Показания к применению:

- астения;
- умственное и физическое переутомление;
- неврастения;
- период реконвалесценции (после операций, тяжелых инфекционных и воспалительных заболеваний).

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- острая сердечно-сосудистая недостаточность;
- почечная недостаточность;
- артериальная гипертензия;
- эпилепсия, эпилептические состояния;
- расстройство сна;
- острые инфекционные заболевания;
- беременность;
- период лактации.

С *осторожностью*: сахарный диабет.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, по 10-15 мл на 100 мл воды 2 раза/сут за 10-15 мин до еды. Курс лечения - 5-7 дней, при необходимости - 2-3 нед.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тахикардия, нарушения сна, головная боль.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание: беременность и период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать препарат в вечернее время во избежание нарушения сна.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: почечная недостаточность.

Источник: http://drugs.thead.ru/Altayskiy_eliksir