

## [Амброксол Врамед](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амброксол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** прозрачный, вязкий, с запахом малины, от бесцветного до светло-желтого цвета.

	<b>5 мл</b>
амброксола гидрохлорид	15 мг

*Вспомогательные вещества:* сорбитол, лимонная кислота, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, глицерол, пропиленгликоль, натрия сахарин, малиновая эссенция, вода очищенная.

100 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Муколитический препарат. Обладает секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого секрета и выделение поверхностно-активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток Клара, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную активность мерцательного эпителия, увеличивает мукоцилиарный транспорт.

После приема внутрь действие развивается через 30 мин и продолжается в течение 6-12 ч.

#### **Фармакокинетика**

##### *Всасывание*

После приема препарата внутрь абсорбция высокая.  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 0.5-3 ч.

##### *Распределение*

Связывание с белками плазмы - 80%. Проникает через ГЭБ, плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.

##### *Метаболизм*

Метаболизируется в печени с образованием дибромантраниловой кислоты и глюкуроновых конъюгатов.

**Выведение**

$T_{1/2}$  составляет 1.3 ч.

Выводится почками: 90% - в виде водорастворимых метаболитов, 5% - в неизменном виде.

**Фармакокинетика в особых клинических случаях**

$T_{1/2}$  увеличивается при тяжелой хронической почечной недостаточности, не меняется при нарушении функции печени.

**Показания к применению:**

Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты:

- острый и хронический бронхит;
- пневмония;
- хроническая обструктивная болезнь легких;
- бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты;
- бронхоэктатическая болезнь.

**Относится к болезням:**

- [Астма](#)
- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Пневмония](#)
- [Хроническая обструктивная болезнь легких](#)

**Противопоказания:**

- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к бромгексину.

С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь, во время приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.

**Взрослым и детям старше 12 лет** препарат назначают в течение первых 2-3 дней по 10 мл (2 чайные ложки), а затем по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза/сут.

**Детям в возрасте 5-12 лет** назначают по 5 мл (1 чайная ложка) 2-3 раза/сут.

**Детям в возрасте 2-5 лет** - по 2.5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза/сут.

При продолжительном курсе лечения дозу можно уменьшить в 2 раза.

**Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек; в отдельных случаях - аллергический контактный дерматит, анафилактический шок.

## **Амброксол Врамед**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - диарея, сухость во рту, запор; при длительном применении в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота.

*Со стороны дыхательной системы:* редко - сухость слизистых оболочек дыхательных путей, ринорея.

*Прочие:* редко - слабость, головная боль, дизурия, экзантема.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея, диспепсия.

*Лечение:* искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 ч после приема препарата; прием пищи, содержащей жиры.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

На основании существующих данных полагают, что препарат не оказывает отрицательного влияния при беременности и в период лактации. Тем не менее препарат не рекомендуется применять в I триместре беременности.

Амброксол выделяется с грудным молоком в количестве, при котором влияние на грудного ребенка отсутствует.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Амброксол Врамед можно комбинировать с другими препаратами. Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.

Совместное применение с противокашлевыми препаратами приводит к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля.

Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксицилина.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат может влиять на клиническую картину при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

#### ***При нарушениях функции почек***

*Состорожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности.

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат назначают детям старше 2 лет (см. Режим дозирования).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Ambroksol\\_Vramed](http://drugs.thead.ru/Ambroksol_Vramed)