

Амфотерицин В (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Амфотерицин В \(мазь\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения желтого цвета, однородной консистенции.

	100 г
амфотерицин В	3 млн.ЕД

Вспомогательные вещества: парафин жидкий (масло вазелиновое), полисорбат (твин-80), вазелин медицинский.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полиеновый макроциклический антибиотик с противогрибковой активностью. Продуцируется *Streptomyces nodosus*. Оказывает фунгицидное или фунгистатическое действие в зависимости от концентрации в биологических жидкостях и от чувствительности возбудителя. Связывается со стеролами (эргостеролами), находящимися в клеточной мембране гриба. В результате нарушается проницаемость мембраны и происходит выход внутриклеточных компонентов во внеклеточное пространство и лизис гриба.

Активен в отношении *Candida spp.*, в том числе против устойчивых к другим противогрибковым препаратам.

Не действует на бактерии, риккетсии, вирусы.

Фармакокинетика

Препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

Показания к применению:

— кандидоз кожи (в том числе устойчивый к лечению другими противогрибковыми препаратами).

Относится к болезням:

- [Кандидоз кожи](#)

Амфотерицин В (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к амфотерицину В и другим компонентам препарата;
- выраженные нарушения функции печени;
- беременность и период лактации;
- период новорожденности (28 дней).

Способ применения и дозы:

Наружно, на пораженные участки кожи тонким слоем, 2-4 раза в сутки.

Длительность курса лечения: при *кандидозе кожи и кожных складок* - 1-3 недели, при *опрелости у детей* - 1-2 недели, при *поражении межпальцевых промежутков и паронихии* - 2-4 недели.

Побочное действие:

Аллергические реакции - ощущение жжения, покалывания, гиперемия кожи, аллергический контактный дерматит; редко - сухость кожных покровов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не использовать окклюзионные повязки.

Если через 1-2 недели терапевтический эффект отсутствует - необходимо уточнить диагноз и дальнейшую тактику лечения.

Использование препарата может привести к сенсibilизации кожи и развитию реакций повышенной чувствительности при последующем использовании данного лекарственного средства (мази) или лекарственной формы Амфотерицина В системного действия.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени

Применение в детском возрасте

Противопоказан новорожденным детям (28 дней).

Условия хранения:

Список Б. При температуре не выше 4°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Amfotericin_V_maz