

Аминокровин



Код АТХ:

- [B05BA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидролизаты белков для парентерального питания](#)
- [Минеральные соли](#)
- [Декстроза](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает метаболическое, дезинтоксикационное действие; субстратное обеспечение анаболизма

Показания к применению:

- нарушение усвоения белков;
- подготовка к оперативному вмешательству и послеоперационный период;
- белковая недостаточность (ожоговая болезнь, ранения, переломы костей, острые инфекции; снижение аппетита различного происхождения; вялोजаживающие раны, неспецифические воспалительные процессы в легких, реконвалесценция).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Раны](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- острая и подострая печеночная недостаточность;
- острая и подострая почечная недостаточность;
- нарушения мозгового кровообращения;
- сердечно-сосудистая и сердечно-легочная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Назначают в/в капельно, 30-35 мл/кг/сут (0.2-0.25 г азота на 1 кг) со скоростью 40-60 кап/мин.

При помощи системы для переливания крови и растворов может быть введен через зонд в желудок или тонкий кишечник.

Побочное действие:

Тошнота, головная боль, жар, боли по ходу вены.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острой и подострой почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при острой и подострой печеночной недостаточности.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aminokrovin>