

## [Аминосалициловая кислота \(таблетки\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Аминосалициловая кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противотуберкулезное средство, представляет собой натриевую соль аминосалициловой кислоты. Оказывает бактериостатическое действие. Проявляет активность только в отношении *Mycobacterium tuberculosis*. По сравнению с другими противотуберкулезными средствами оказывает более слабое действие. При применении в качестве монотерапии к аминосалициловой кислоте быстро развивается устойчивость.

#### **Фармакокинетика**

Абсорбция высокая. При воспалении мозговых оболочек проникает в спинномозговую жидкость в умеренной степени. Легко проникает через гистогематические барьеры и распределяется в тканях. Подвергается метаболизму. 50% дозы определяется в моче в виде ацетилированного производного.  $T_{1/2}$  - 30 мин. Общий клиренс зависит как от скорости метаболизма, так и от выведения почками.

### **Показания к применению:**

Лечение туберкулеза при отсутствии возможности применения других более сильных средств.

### **Относится к болезням:**

- [Туберкулез](#)

### **Противопоказания:**

Почечная и/или печеночная недостаточность, гепатит, цирроз печени, амилоидоз внутренних органов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, микседема, эпилепсия, беременность, повышенная чувствительность к аминосалициловой кислоте и ее солям.

### **Способ применения и дозы:**

---

## **Аминосалициловая кислота (таблетки)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Принимают внутрь. Для взрослых суточная доза составляет 10-12 г, частота приема 2-3 раза/сут. Для детей - 150-300 мг/кг/сут, частота приема 3-4 раза/сут.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* тошнота, рвота, диарея, гипокалиемия.

*Редко:* кожные реакции, лихорадка, артралгия, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, синдром, сходный с инфекционным мононуклеозом, желтуха, энцефалит, почечная недостаточность, гемолитическая анемия у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, агранулоцитоз, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения.

*В единичных случаях:* психозы.

*При длительном применении в высоких дозах:* гипотиреоз, зоб.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Полагают, что аминосалицилаты, применяемые в I триместре беременности, могут вызывать врожденные дефекты плода. Аминосалициловая кислота в небольших количествах выделяется с грудным молоком.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Аминосалициловая кислота повышает  $T_{1/2}$  изониазида.

Побочные эффекты аминосалицилатов и салицилатов имеют аддитивный характер.

Пробенецид может повышать токсичность аминосалицилата путем нарушения его почечной экскреции и повышения концентрации в плазме.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Аминосалициловую кислоту и ее соли следует применять в комбинации с другими противотуберкулезными средствами.

С особой осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функций почек и печени.

В присутствии аминосалицилатов нарушается проведение тестов на глюкозурию, в которых используются реагенты, содержащие медь.

#### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при почечной недостаточности. С особой осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функций почек.

#### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при печеночной недостаточности, гепатите, циррозе печени. С особой осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функций печени.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Aminosalicilovaya\\_Kislota\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Aminosalicilovaya_Kislota_tabletki)