

Аминостерил Ке



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инфузий 10% прозрачный или слегка опалесцирующий, бесцветный или слегка желтоватого цвета.

	1 л
L-лейцин	7.06 г
L-изолейцин	4.67 г
L-лизина гидрохлорид	7.46 г,
что соответствует содержанию L-лизина	5.97 г
L-метионин	4.1 г
L-фенилаланин	4.82 г
L-треонин	4.21 г
L-триптофан	1.82 г
L-валин	5.92 г
L-аргинин	10.64 г
L-гистидин	2.88 г
глицин	15.95 г
L-аланин	15 г
L-пролин	15 г
L-яблочная кислота	8.08 г
калия хлорид	683 мг
калия гидроксид 85%	716 мг
натрия гидроксид	1.2 г
магния хлорида гексагидрат	1.017 г
что эквивалентно содержанию:	
Na ⁺	30 ммоль
K ⁺	20 ммоль
Mg ²⁺	5 ммоль
Cl ⁻	60 ммоль
общий азот 16 г/л	
теоретическая осмолярность 1048 мОсм/л	
рН 5.3-6.0	

Вспомогательные вещества: вода д/и.

250 мл - флаконы стеклянные (10) - коробки картонные.

500 мл - флаконы стеклянные (10) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Аминостерил Ке содержит аминокислоты (заменяемые и незаменимые), необходимые для синтеза белка в организме и

достижения положительного баланса азота при парентеральном питании.

Показания к применению:

Аминостерил КЕ предназначен для частичного или полного парентерального питания. В сочетании с соответствующим введением углеводов, а также жировых эмульсий в качестве источников энергии, служит для полного парентерального питания.

Противопоказания:

- нарушения обмена аминокислот;
- гиперкалиемия;
- нарушения функции почек;
- декомпенсированная сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Перед применением следует убедиться, что раствор прозрачен, а упаковка не повреждена.

Вводить в/в до 1.3 мл/1 кг массы тела в час, или до 25-30 капель в 1 минуту на 70 кг массы тела.

Максимальная доза 1 л в день на 70 кг массы тела, что соответствует примерно 16.0 г азота.

Для удовлетворения потребности в калориях одновременно можно вливать растворы углеводов.

Учитывать осмолярность!

Побочное действие:

Возможны реакции гиперчувствительности.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Специальных контролируемых клинических исследований по применению при беременности и лактации не проводилось, поэтому применение препарата у этой категории пациентов возможно при тщательной оценке соотношения риск/польза.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Применение препарата противопоказано при нарушении функции почек.

Применение в детском возрасте

Специальных контролируемых клинических исследований по применению в детском возрасте не проводилось, поэтому применение препарата у этой категории пациентов возможно при тщательной оценке риск/польза.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после окончания срока годности.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aminosteril_Ke