Аминостигмин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обратимый ингибитор холинэстеразы.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается при в/м введении, проникает через ГЭБ.

Показания к применению:

— интоксикация м-холиноблокаторами (в т.ч. атропиноподобными алкалоидами).

Относится к болезням:

- Интоксикация

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— бронхиальная астма;

— стенокардия;

— брадикардия;

— артериальная гипотензия.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают в/м.

При отравлениях легкой степени доза составляет1 мг, в более тяжелых случаях - 2 мг 3 раза (через 1-2 и через 3-5 ч).

При тяжелых отравлениях - одновременно в/в и в/м - 2 мг, далее по схеме лечения отравлений средней тяжести. Максимальная суточная доза - 10 мг в/м или 7 мг в/в.

Побочное действие:

Брадикардия, снижение АД, тошнота, рвота.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aminostigmin