

[АМИНОСТИГМИН](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обратимый ингибитор холинэстеразы.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается при в/м введении, проникает через ГЭБ.

Показания к применению:

— интоксикация м-холиноблокаторами (в т.ч. атропиноподобными алкалоидами).

Относится к болезням:

- [Интоксикация](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- бронхиальная астма;
- стенокардия;
- брадикардия;
- артериальная гипотензия.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают в/м.

При отравлениях легкой степени доза составляет 1 мг, в более тяжелых случаях - 2 мг 3 раза (через 1-2 и через 3-5 ч).

Аминостигмин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При тяжелых отравлениях - одновременно в/в и в/м - 2 мг, далее по схеме лечения отравлений средней тяжести.
Максимальная суточная доза - 10 мг в/м или 7 мг в/в.

Побочное действие:

Брадикардия, снижение АД, тошнота, рвота.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aminostigmin>