

Аминтакс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные желтого цвета, торпедообразной формы; допускается наличие воздушного стержня и/или воронкообразного углубления.

	1 капс.
неомицин	35000 ME
нистатин	100000 ME
полимиксин В	35000 ME

Вспомогательные вещества: макрогол 400 и макрогол 1500 в соотношении (5:95) - до получения суппозитория 2400 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство. Оказывает антибактериальное, бактерицидное и противогрибковое действие.

Оказывает бактерицидное действие на грамположительные (*Staphylococcus aureus*, коринебактерии и др.) и грамотрицательные микроорганизмы (*Enterococcus faecium*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Hemophilus influenzae*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Ureaplasma urealyticum*).

Обладает фунгицидным действием на патогенные грибы, особенно дрожжеподобные рода *Candida albicans*, *Cryptococcus*, *Histoplasma*. Улучшает трофические процессы в слизистой.

Фармакокинетика

Равномерно распределяется по слизистой оболочке, оказывая местно бактерицидное и фунгицидное действие; практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки.

Показания к применению:

Цервицит; вагинит (бактериального, грибкового или смешанного генеза); предоперационная профилактика

инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах, перед родами, при установке контрацептивной спирали, при внутриуретральных исследованиях.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность; I триместр беременности; период лактации.

Способ применения и дозы:

Местно, по 1-2 разовые дозы/сут.

Побочное действие:

Местные реакции: жжение, зуд, раздражение, контактная экзема.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Применяется во II-III триместрах беременности только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Аднексит
- Апоплексия яичника
- Атрофический вагинит
- Бактериальный вагиноз

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Amintaks>