Амintакс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные желтого цвета, торпедообразной формы; допускается наличие воздушного стержня и/или воронкообразного углубления.

	1 капс.
неомицин	35000 МЕ
нистатин	100000 МЕ
полимиксин В	35000 МЕ

Вспомогательные вещества: макрогол 400 и макрогол 1500 в соотношении (5:95) - до получения суппозитория 2400 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство. Оказывает антибактериальное, бактерицидное и противогрибковое действие.

Оказывает бактерицидное действие на грамположительные (Staphylococus aureus, коринебактерии и др.) и грамотрицательные микроорганизмы (Enterococus faccium, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Hemophilus influenzae, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Ureaplasma urealyticum).

Обладает фунгицидным действием на патогенные грибы, особенно дрожжеподобные рода Candida albicans, Cryptococcus, Hystoplasma. Улучшает трофические процессы в слизистой.

Фармакокинетика

Равномерно распределяется по слизистой оболочке, оказывая местно бактерицидное и фунгицидное действие; практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки.

Показания к применению:

Цервицит; вагинит (бактериального, грибкового или смешанного генеза); предоперационная профилактика

инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах, перед родами, при установке контрацептивной спирали, при внутриуретральных исследованиях.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Инфекции

Противопоказания:

Гиперчувствительность; I триместр беременности; период лактации.

Способ применения и дозы:

Местно, по 1-2 разовые дозы/сут.

Побочное действие:

Местные реакции: жжение, зуд, раздражение, контактная экзема.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Применяется во II-III триместрах беременности только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Аднексит
- Апоплексия яичника
- Атрофический вагинит
- Бактериальный вагиноз

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Источник: http://drugs.thead.ru/Amintaks