# Аммиак Буфус



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Раствор для местного применения 10%*** прозрачный, бесцветный, летучий, с резким запахом.

| | **1 л** |
|---|---|
| аммиак водный | 440 мл |

*Вспомогательные вещества:* вода очищенная.

1 мл - тюбик-капельницы (5) с клапаном - пачки картонные.
1 мл - тюбик-капельницы (10) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - тюбик-капельницы (1) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
40 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Аналептическое, антисептическое средство; при вдыхании вызывает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и рефлекторно возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. В высоких концентрациях вызывает рефлекторную остановку дыхания. Оказывает дезинфицирующее действие на кожу. При длительном контакте раздражающее действие на кожу может переходить в прижигающее (коагуляция белков) с развитием гиперемии, отечности и болезненности.

***Фармакокинетика***

Быстро выводится при любом способе введения, главным образом легкими и бронхиальными железами.

## Показания к применению:

Обморок, дезинфекция кожи рук, нейтрализация кислых токсинов при укусах насекомых.

## Противопоказания:

Гиперчувствительность; при наружном применении - нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и другие заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.

*С осторожностью.* Беременность, период лактации, детский возраст.

## Способ применения и дозы:

Ингаляционно, наружно.

Для возбуждения дыхания и выведения больных из обморока - ингаляционно: осторожно подносят небольшой кусочек ваты или марли, смоченной аммиаком, к носовым отверстиям (на 0.5-1 см). В хирургической практике используют для дезинфекции кожи рук по методу С. И. Спасокукоцкого и И. Г. Кочергина (для приготовления раствора 25 мл аммиака растворяют в 5 л теплой кипяченой воды). При укусах насекомых применяют в виде примочек.

## Побочное действие:

Остановка дыхания (рефлекторная, при вдыхании в высокой концентрации), гиперсаливация, першение в горле, гиперемия слизистой оболочки полости рта. Ожог пищевода и желудка (при случайном приеме внутрь).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

*С осторожностью. б*еременность, период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нейтрализует кислоты.

## Особые указания и меры предосторожности:

***Применение в детском возрасте***

*С осторожностью* детский возраст.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности*. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ammiak_Bufus