Аммифурин



Код АТХ:

- D05AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амми большой плодов фурокумарины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки	**1 таб.**
Амми большой плодов фурокумарины (изопимпинеллин, бергаптен и ксантотоксин)	20 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Раствор для наружного применения 0.3%.

	100 мл
Амми большой плодов фурокумарины	300 мг

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
1 л - флаконы темного стекла.
5 л - флаконы темного стекла.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фотосенсибилизирующее средство. Сенсибилизирует кожу к действию света: при облучении УФ-лучами стимулирует образование меланоцитами эндогенного пигмента кожи меланина. Применение совместно с УФ-облучением способствует восстановлению пигментации кожи при витилиго.

Показания к применению:

В качестве фотосенсибилизирующего средства в сочетании с УФО:

— витилиго;

— гнездная и тотальная алопеция;

— грибовидный микоз;

— псориаз.

Относится к болезням:

- Витилиго
- Микоз
- Псориаз

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— острый гастрит;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— панкреатит;

— гепатит;

— цирроз печени;

— нефрит;

— сахарный диабет;

— кахексия;

— артериальная гипертензия;

— декомпенсированные эндокринные заболевания;

— тиреотоксикоз;

— туберкулез;

— заболевания крови;

— хроническая серденчая недостаточность;

— злокачественные и доброкачественные опухоли;

— беременность;

— период лактации;

— катаракта;

— множественные пигментные невусы.

С *осторожностью* - детский возраст (до 5 лет), пожилой возраст (старше 60 лет).

Способ применения и дозы:

В сочетании с облучением (длинноволновые УФ-лучи 320-390 нм).

Наружно 0.3% раствор наносят на очаги поражения за 1 ч до облучения. При псориазе процедуры проводят 4 раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница), при других заболеваниях - 3-4 раза в неделю. УФ-облучение начинают с 1/2 биодозы, постепенно увеличивают до 5-6 биодоз, что соответствует продолжительности облучения от 1-2 до 10-15 мин. Общее количество облучений - 15-20.

Внутрь, после еды, запивая молоком, в дозе 0.8 мг/кг (высшая разовая доза - 80 мг) однократно за 2 ч до УФ-облучения.

Курсовая доза - 2-3 г (100-150 таб.) или 0.15-0.3 г (1-2 флакона 0.3% раствора). Повторные курсы проводят через 1-1.5 мес. Больным с ограниченными участками поражения кожи - иногда только наружно (в сочетании с УФ-облучением).

Побочное действие:

Головная боль, головокружение, сердцебиение, кардиалгия, диспепсия, тошнота, гастралгия. При передозировке солнечного и искусственного УФО - острый дерматит (гиперемия кожи, отек, пузыри).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано к применению при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При депигментации кожи (лейкодермии), связанной с деструкцией меланоцитов, неэффективен.

Необходимо предупреждать больных о возможности развития буллезных дерматитов при сочетании облучения очагов поражения ртутно-кварцевой лампой и воздействия солнечной радиации. Следует строго соблюдать предписанный режим облучения.

Во время лечения рекомендуется в дневные часы носить светозащитные очки.

В летние месяцы во избежание суммированного действия искусственной и естественной УФ-радиации рекомендуется сочетать лечение с дозированным облучением солнечным светом.

Наилучший эффект отмечается у лиц молодого возраста, при небольшой давности заболевания, у брюнетов и лиц, склонных к загару.

Лечение должно проводиться под тщательным врачебным наблюдением.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при гепатите и циррозе печени.

Применение в пожилом возрасте

С *осторожностью* - пожилой возраст (старше 60 лет).

Применение в детском возрасте

С *осторожностью* - детский возраст (до 5 лет).

Источник: http://drugs.thead.ru/Ammifurin