

## [Аммифурин](#)



### Код АТХ:

- [D05AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амми большой плодов фурукумарины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Таблетки</b>                                                             | <b>1 таб.</b> |
| Амми большой плодов фурукумарины (изопимпинеллин, бергаптен и ксантотоксин) | 20 мг         |

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

#### **Раствор для наружного применения 0.3%.**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
|                                  | <b>100 мл</b> |
| Амми большой плодов фурукумарины | 300 мг        |

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
1 л - флаконы темного стекла.  
5 л - флаконы темного стекла.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Фотосенсибилизирующее средство. Сенсибилизирует кожу к действию света: при облучении УФ-лучами стимулирует образование меланоцитами эндогенного пигмента кожи меланина. Применение совместно с УФ-облучением способствует восстановлению пигментации кожи при витилиго.

## Показания к применению:

В качестве фотосенсибилизирующего средства в сочетании с УФО:

- витилиго;
- гнездная и тотальная алопеция;
- грибовидный микоз;
- псориаз.

## Относится к болезням:

- [Витилиго](#)
- [Микоз](#)
- [Псориаз](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- острый гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- панкреатит;
- гепатит;
- цирроз печени;
- нефрит;
- сахарный диабет;
- кахексия;
- артериальная гипертензия;
- декомпенсированные эндокринные заболевания;
- тиреотоксикоз;
- туберкулез;
- заболевания крови;
- хроническая сердечная недостаточность;
- злокачественные и доброкачественные опухоли;
- беременность;
- период лактации;
- катаракта;
- множественные пигментные невусы.

С *осторожностью* - детский возраст (до 5 лет), пожилой возраст (старше 60 лет).

## Способ применения и дозы:

В сочетании с облучением (длинноволновые УФ-лучи 320-390 нм).

Наружно 0.3% раствор наносят на очаги поражения за 1 ч до облучения. При псориазе процедуры проводят 4 раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница), при других заболеваниях - 3-4 раза в неделю. УФ-облучение начинают с 1/2 биодозы, постепенно увеличивают до 5-6 биодоз, что соответствует продолжительности облучения от 1-2 до 10-15 мин. Общее количество облучений - 15-20.

Внутрь, после еды, запивая молоком, в дозе 0.8 мг/кг (высшая разовая доза - 80 мг) однократно за 2 ч до УФ-облучения.

Курсовая доза - 2-3 г (100-150 таб.) или 0.15-0.3 г (1-2 флакона 0.3% раствора). Повторные курсы проводят через 1-1.5 мес. Больным с ограниченными участками поражения кожи - иногда только наружно (в сочетании с УФ-облучением).

## **Побочное действие:**

Головная боль, головокружение, сердцебиение, кардиалгия, диспепсия, тошнота, гастралгия. При передозировке солнечного и искусственного УФО - острый дерматит (гиперемия кожи, отек, пузыри).

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано к применению при беременности и в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При депигментации кожи (лейкодермии), связанной с деструкцией меланоцитов, неэффективен.

Необходимо предупреждать больных о возможности развития буллезных дерматитов при сочетании облучения очагов поражения ртутно-кварцевой лампой и воздействия солнечной радиации. Следует строго соблюдать предписанный режим облучения.

Во время лечения рекомендуется в дневные часы носить светозащитные очки.

В летние месяцы во избежание суммированного действия искусственной и естественной УФ-радиации рекомендуется сочетать лечение с дозированным облучением солнечным светом.

Наилучший эффект отмечается у лиц молодого возраста, при небольшой давности заболевания, у брюнетов и лиц, склонных к загару.

Лечение должно проводиться под тщательным врачебным наблюдением.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказано при гепатите и циррозе печени.

### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью - пожилой возраст (старше 60 лет).

### **Применение в детском возрасте**

С осторожностью - детский возраст (до 5 лет).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ammifurin>