

## Аморолфин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

◇ **Лак для ногтей лекарственный** в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-желтого цвета.

	<b>1 мл</b>
аморолфина гидрохлорид	55.7 мг,
что соответствует содержанию аморолфина	50 мг

Вспомогательные вещества: триацетин - 10.5 мг, сополимер аммония метакрилата (тип А) - 125 мг, этилацетат - 150 мг, бутилацетат - 50 мг, этанол 95% - до 1 мл.

0.5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

1 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

1.5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

2 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

2.5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

3 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

3.5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

4 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

4.5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

6 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

7 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

8 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

9 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

10 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковое средство для наружного применения. Обладает фунгистатическим и фунгицидным действием. Повреждает клеточную мембрану грибов, в основном за счет нарушения синтеза стеролов. Снижает содержание эргостерола, вызывает накопление аномальных неплоскостных стереоизомеров стеролов. Активен в отношении дрожжевых грибов рода *Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Malassezia* spp., *Cryptococcus* spp., дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton* spp.), плесневых грибов (*Altemaria*, *Hendersonula*, *Scopulariopsis*), грибов *Dematiaceae* (*Cladosporium*, *Fonsecaea*, *Wangiella*), диморфных грибов (*Coccidioides*, *Histoplasma* spp., *Sporothrix*) и актиномицетов.

#### Фармакокинетика

## Аморолфин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При наружном применении в соответствующих лекарственных формах системная абсорбция незначительна.

### Показания к применению:

Онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами (в том случае если поражено не более 2/3 ногтевой пластинки). Профилактика грибковых поражений ногтей.

### Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

### Противопоказания:

Период новорожденности и ранний детский возраст, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к аморолфину.

### Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Доза и длительность лечения зависят от показаний и используемой лекарственной формы.

### Побочное действие:

*Местные реакции:* жжение, гиперемия, зуд.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность, период лактации.

### Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей или накладными ногтями. При работе с органическими растворителями следует надевать непроницаемые перчатки. Пилки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Amorolfin>