Амтерсол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аммония хлорид
- Калия бромид
- Натрия бензоат
- Солодки корней экстракт
- Термопсиса ланцетного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп***	**100 г**
аммония хлорид	200 мг
калия бромид	1 г
натрия бензоат	1 г
густой экстракт корня солодки	600 мг
жидкий экстракт травы термопсиса (1:2)	200 мг

100 г - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Экстракт солодкового корня оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Экстракт термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный, а в высоких дозах, на рвотный центры.

Калия бромид снижает возбудимость ЦНС.

Аммония хлорид оказывает отхаркивающее, диуретическое действие.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: алкоголизм, эпилепсия, заболевания печени, заболевания и травмы головного мозга (вследствие наличия этанола в препарате), сахарный диабет (вследствие высокого содержания сахара в препарате).

Способ применения и дозы:

Препарат применяют внутрь, после еды.

Детям от 3 до 6 лет: по $^{1}/_{2}$ чайной ложки 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет: по 1 чайной ложке 3 раза/сут.

Подросткам от 12 до 18 лет: по 1 десертной ложке 3 раза /сут.

Взрослым: по 1 столовой ложке 3 раза/сут.

Средний курс лечения - 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны тошнота, рвота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Амтерсол не следует применять одновременно с препаратами, содержащими противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

С осторожностью: заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Amtersol