

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: алкоголизм, эпилепсия, заболевания печени, заболевания и травмы головного мозга (вследствие наличия этанола в препарате), сахарный диабет (вследствие высокого содержания сахара в препарате).

Способ применения и дозы:

Препарат применяют внутрь, после еды.

Детям от 3 до 6 лет: по $\frac{1}{2}$ чайной ложки 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет: по 1 чайной ложке 3 раза/сут.

Подросткам от 12 до 18 лет: по 1 десертной ложке 3 раза /сут.

Взрослым: по 1 столовой ложке 3 раза/сут.

Средний курс лечения - 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны тошнота, рвота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Амтерсол не следует применять одновременно с препаратами, содержащими противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Амтерсол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

С осторожностью: заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Amtersol>