

[Анаферон детский \(капли\)](#)



Код АТХ:

- [J05AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь. По 25 мл во флаконах из окрашенного стекла, укупоренных крышками с контролем первого вскрытия, с капельницей. Каждый флакон помещают в пачку из картона.

Состав:

Капли для приема внутрь	1 мл
<i>активные вещества:</i>	
антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные*	0,006 г
<i>вспомогательные вещества:</i> мальтитол — 0,06 г; глицерол — 0,03 г; сорбат калия — 0,00165 г; лимонная кислота безводная — 0,0002 г; вода очищенная — до 1 мл	
* Вводятся в виде смеси трех активных водных разведений субстанции, разведенной соответственно в 100 ¹² , 100 ³⁰ , 100 ⁵⁰ раз	

Описание:

Бесцветная или почти бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовирусное, иммуномодулирующее.

Фармакодинамика

Фармакологическое действие — иммуномодулирующее, противовирусное. В ходе доклинических и клинических исследований доказана эффективность препарата в отношении вирусов гриппа, парагриппа, вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов (лабиальный герпес, генитальный герпес), других герпес-вирусов (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), энтеровирусов, вируса клещевого энцефалита, ротавируса, коронавируса, калицивируса, аденовируса, респираторно-синцитиального (РС-вируса). Препарат снижает концентрацию вируса в пораженных тканях, влияет на систему эндогенных интерферонов и сопряженных с ними цитокинов, индуцирует образование эндогенных «ранних» интерферонов (ИФН α/β) и гамма интерферона (ИФН γ).

Стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ. Повышает продукцию антител (включая секреторный IgA), активизирует функции Т-эффекторов, Т-хелперов (Тх), нормализует их соотношение. Повышает функциональный резерв Тх и других клеток, участвующих в иммунном ответе. Является индуктором смешанного Тх1- и Тх2-иммунного ответа: повышает выработку цитокинов Тх1 (ИФН γ ИЛ-2) и Тх2 (ИЛ-4, -10), восстанавливает (модулирует) баланс Тх1/Тх2. Повышает функциональную активность фагоцитов и естественных клеток-киллеров (ЕК-клеток). Обладает антимуtagenными свойствами.

Показания к применению:

— лечение острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей у детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет включительно.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 1 мес;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, вне приема пищи. В первые сутки лечения первые 5 приемов препарата следует проводить в промежутке между кормлениями либо за 15 мин до кормления ребенка или приема жидкости.

Назначают по 10 капель на прием (капли дозируют в ложку).

В первые сутки лечения: первые 2 ч - по 10 капель каждые 30 мин, затем, в оставшееся время, еще 3 раза через равные промежутки времени. Со 2 по 5 сутки - по 10 капель 3 раза/сут.

Побочное действие:

При использовании по указанным показаниям и в указанных дозировках побочного действия не выявлено.

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

Случаев передозировки до настоящего времени не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения Анаферона детского при беременности и в период лактации не изучалась.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anaferon_detskiy_kapli