

## [Анаколд](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ **Таблетки** белые, плоские, с тиснением "d.p" на одной стороне и риской - на другой.

	<b>1 таб.</b>
парацетамол	325 мг
фенилэфрина гидрохлорид	5 мг
хлорфенамина малеат	2 мг

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, поливинилпирролидон, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, применяемый при простудных заболеваниях, действие которого обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов.

Парацетамол оказывает жаропонижающее, анальгезирующее и слабое противовоспалительное действие.

Хлорфенамин, блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, оказывает противоаллергическое действие. Уменьшает явления экссудации, подавляет симптомы аллергического ринита (заложенность носа, чиханье, ринорея).

Фенилэфрин – симпатомиметик прямого действия. Воздействуя на α-адренорецепторы, расположенные в артериолах слизистой оболочки носовой полости, вызывает сужение артериол, чем уменьшает отек слизистой оболочки и количество отделяемого из носовой полости.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Анаколд не предоставлены.

### Показания к применению:

— лихорадка при простудных заболеваниях и других инфекционно-воспалительных заболеваниях;

- умеренный или слабо выраженный болевой синдром (в т.ч. головная боль, миалгия, боль в горле, дисменорея);
- аллергические состояния верхних отделов дыхательных путей (заложенность носа, чиханье, ринит).

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Головная боль](#)
- [Дисменорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)
- [Миалгия](#)
- [Ринит](#)

## Противопоказания:

- генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- заболевания крови;
- выраженные нарушения функции печени или почек;
- синдром Жильбера (конституциональная гипербилирубинемия);
- беременность;
- лактация;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначают по 2 таб. 3-4 раза/сут с интервалом между приемами не менее 4 ч. Суточная доза не должна превышать 12 таб.

**Детям в возрасте старше 12 лет** назначают по 1 таб. 4 раза/сут с интервалом между приемами не менее 4 ч. Суточная доза - не более 4 таб.

Продолжительность приема в качестве жаропонижающего средства - не более 3 дней, в качестве *анальгезирующего средства* - не более 5 дней.

Препарат следует принимать после еды.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия; нарушение функции печени.

*Со стороны системы кроветворения:* тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз.

*Со стороны мочевыделительной системы:* задержка мочи, нарушение функции почек.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, крапивница.

*Прочие:* тахикардия, заторможенность, вялость.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, боли в желудке; в тяжелых случаях - психомоторное возбуждение, головокружение, потеря аппетита, почечная недостаточность, энцефалопатия и коматозное состояние.

*Лечение:* пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь) и

провести симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат Анаколд противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении препарата Анаколд с барбитуратами, дифенином, карбамазепином, рифампицином, зидовудином и другими индукторами микросомальных ферментов печени повышается риск его гепатотоксического действия.

Одновременное применение Анаколда с непрямыми антикоагулянтами (в т.ч. варфарином) повышает риск развития кровотечения.

При одновременном применении с препаратами, угнетающими ЦНС (барбитураты, этанол, опиоидные анальгетики), усиливается седативный эффект Анаколда.

При одновременном применении Анаколд усиливает эффект ингибиторов MAO.

При одновременном применении Анаколда с препаратами, обладающими холиноблокирующей активностью (атропин, некоторые антидепрессанты) усиливается холиноблокирующее действие.

Совместное применение с трициклическими антидепрессантами может привести к резкому увеличению АД.

Одновременное применение с глюкокортикоидами повышает риск развития глаукомы.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушениями функции печени и почек, при хронических заболеваниях сердца, гипертиреозе и у пациентов пожилого возраста.

Во избежание токсического поражения печени препарат не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому алкоголизму.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек. С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушениями функции почек.

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени. С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушениями функции печени.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°C.

### ***Условия отпуска из аптек***

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## **Срок годности:**

3 года.

**Анаколд**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Anakold>