Анатоксин Столбнячный Очищенный Адсорбированный Жидкий Для Доноров (Ас-Анатоксин)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вызывает формирование специфического иммунитета против столбняка. В одной прививочной дозе содержится 10 антитоксинвызывающих единиц (ЕС) столбнячного анатоксина, что соответствует не менее 40 МИЕ.

Показания к применению:

Активная иммунизация против столбняка в соответствии с графиком плановых прививок; экстренная профилактика столбняка.

Относится к болезням:

- Столбняк

Противопоказания:

Для проведения экстренной профилактики противопоказаний нет. Для проведения плановой вакцинации - острые инфекционные заболевания и хронические заболевания в фазе обострения.

Способ применения и дозы:

Активная иммунизация проводится у лиц, ранее не привитых против столбняка, и состоит из двух прививок с интервалом 30-40 дней и ревакцинацией через 6-12 мес с использованием каждый раз 1 дозы анатоксина. Последующие ревакцинации - 1 раз в 10 лет однократно. С целью экстренной профилактики анатоксин вводят с противостолбнячной сывороткой. Доза и кратность введения устанавливаются индивидуально, в зависимости от клинической ситуации. Анатоксин вводят п/к в подлопаточную область.

Побочное действие:

Возможно: слабость, недомогание, головная боль, подъем температуры (указанные симптомы обычно исчезают через 24-48 ч).

В очень редких случаях: анафилактический шок.

Местные реакции: покраснение, отек, болезненность в месте введения.

Особые указания и меры предосторожности:

После введения анатоксина необходимо наблюдение за пациентом в течение 30 мин для принятия необходимых срочных мер в случае развития острых побочных реакций.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anatoksin_Stolbnyachnyy_Ochishchennyy_Adsorbirovannyy_Zhidkiy_Dlya_Donorov_As-Anatoksin