
Анауран



Код АТХ:

- S02AA30

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Неомицин
- Полимиксин b

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли ушные***	**1 мл**
полимиксина В сульфат	10 тыс.МЕ
неомицина сульфат в пересчете на неомицин	3.75 тыс.МЕ (5 мг)
лидокаина гидрохлорид	40 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, пропиленгликоль, глицерол, вода очищенная.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает антибактериальное и местноанестезирующее действие.

Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия. Действует бактерицидно в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae) и грамотрицательных

(Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Proteus spp.) микроорганизмов; в отношении Streptococcus spp. - малоактивен.

Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Pseudomonas aeruginosa. Не активен в отношении Proteus spp., Mycobacterium spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие.

Лидокаин - местноанестезирующее средство, быстро устраняет боль и зуд.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились, т.к. препарат предназначен для местного применения и системные эффекты маловероятны.

Показания к применению:

— острый и хронический наружный отит;

— средний острый отит на стадии до перфорации;

— хронический экссудативный средний отит;

— послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии,тимпанопластики, антротомии, фенестрации**.**

Относится к болезням:

- Мастит
- Отит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Местно, в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После закапывания несколько минут держать голову наклоненной.

Взрослым - по 4-5 капель 2-4 раза/сут, **детям** - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Побочное действие:

Возможны *местные аллергические реакции*: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения после отмены препарата.

Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако, при длительном лечении возможно появление системных побочных эффектов, в частности, ототоксичности и нефротоксичности вследствие всасывания неомицина.

Передозировка:

В литературе не описаны случаи передозировки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и лактации препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача .

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеперечисленных антибиотиков).

Особые указания и меры предосторожности:

Анауран применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами.

У **детей до 1 года** препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Применение в детском возрасте

Детям - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания. У **детей до 1 года** препарат следует применять только и случае крайней необходимости и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить в недоступных для детей местах при температуре от 15°С до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anauran