

## [Анауран](#)



### Код АТХ:

- [S02AA30](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Неомицин](#)
- [Полимиксин b](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↕ <b>Капли ушные</b>	<b>1 мл</b>
полимиксина В сульфат	10 тыс.МЕ
неомицина сульфат в пересчете на неомицин	3.75 тыс.МЕ (5 мг)
лидокаина гидрохлорид	40 мг

*Вспомогательные вещества:* бензалкония хлорид, пропиленгликоль, глицерол, вода очищенная.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает антибактериальное и местноанестезирующее действие.

Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия. Действует бактерицидно в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных

(Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Proteus spp.) микроорганизмов; в отношении Streptococcus spp. - малоактивен.

Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Pseudomonas aeruginosa. Не активен в отношении Proteus spp., Mycobacterium spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие.

Лидокаин - местноанестезирующее средство, быстро устраняет боль и зуд.

#### **Фармакокинетика**

Фармакокинетические исследования не проводились, т.к. препарат предназначен для местного применения и системные эффекты маловероятны.

### **Показания к применению:**

- острый и хронический наружный отит;
- средний острый отит на стадии до перфорации;
- хронический экссудативный средний отит;
- послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии, тимпанопластики, антротомии, фенестрации.

### **Относится к болезням:**

- [Мастит](#)
- [Отит](#)

### **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Местно, в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После закапывания несколько минут держать голову наклоненной.

**Взрослым** - по 4-5 капель 2-4 раза/сут, **детям** - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Курс лечения не должен превышать 7 дней.

### **Побочное действие:**

Возможны *местные аллергические реакции*: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения после отмены препарата.

Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако, при длительном лечении возможно появление системных побочных эффектов, в частности, ототоксичности и нефротоксичности вследствие всасывания неомидина.

### **Передозировка:**

В литературе не описаны случаи передозировки.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

## **Анауран**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В период беременности и лактации препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача .

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеперечисленных антибиотиков).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Анауран применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами.

У **детей до 1 года** препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

#### ***Применение в детском возрасте***

**Детям** - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания. У **детей до 1 года** препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

### **Условия хранения:**

Хранить в недоступных для детей местах при температуре от 15°C до 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Anauran>