

[Анауран](#)



Код АТХ:

- [S02AA30](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Неомицин](#)
- [Полимиксин b](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли ушные	1 мл
полимиксина В сульфат	10 тыс.МЕ
неомицина сульфат в пересчете на неомицин	3.75 тыс.МЕ (5 мг)
лидокаина гидрохлорид	40 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, пропиленгликоль, глицерол, вода очищенная.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает антибактериальное и местноанестезирующее действие.

Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия. Действует бактерицидно в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных

(*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus* spp.) микроорганизмов; в отношении *Streptococcus* spp. - малоактивен.

Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi*, *Pseudomonas aeruginosa*. Не активен в отношении *Proteus* spp., *Mycobacterium* spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие.

Лидокаин - местноанестезирующее средство, быстро устраняет боль и зуд.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились, т.к. препарат предназначен для местного применения и системные эффекты маловероятны.

Показания к применению:

- острый и хронический наружный отит;
- средний острый отит на стадии до перфорации;
- хронический экссудативный средний отит;
- послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии, тимпаноластики, антротомии, фенестрации.

Относится к болезням:

- [Мастит](#)
- [Отит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Местно, в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После закапывания несколько минут держать голову наклоненной.

Взрослым - по 4-5 капель 2-4 раза/сут, **детям** - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Побочное действие:

Возможны *местные аллергические реакции*: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения после отмены препарата.

Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако, при длительном лечении возможно появление системных побочных эффектов, в частности, ототоксичности и нефротоксичности вследствие всасывания неомидина.

Передозировка:

В литературе не описаны случаи передозировки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и лактации препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача .

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеперечисленных антибиотиков).

Особые указания и меры предосторожности:

Анауран применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами.

У **детей до 1 года** препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Применение в детском возрасте

Детям - по 2-3 капли 3-4 раза/сут в зависимости от тяжести заболевания. У **детей до 1 года** препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить в недоступных для детей местах при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Anauran?page=1>