Андипал



Код АТХ:

- N02BB72

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бендазол
- Метамизол натрия
- Папаверин
- Фенобарбитал

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает вазодилатирующее, анальгезирующее, спазмолитическое и седативное действие.

Показания к применению:

— болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга;

— артериальная гипертензия.

Относится к болезням:

- Артериальная гипертензия
- Болевой синдром
- Гипертензия
- Спазмы

Противопоказания:

— выраженная почечная/печеночная недостаточность;

— дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

— заболевания крови;

— тахиаритмия;

— тяжелая стенокардия;

— декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность;

— закрытоугольная глаукома;

— гиперплазия предстательной железы;

— кишечная непроходимость;

— мегаколон;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 8 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, запор, нарушение функции печени.

Со стороны ЦНС: сонливость, снижение скорости психомоторных реакций.

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, агранулоцитоз.

Прочие: аллергические реакции, снижение АД, нарушения функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает гипотензивное действие нитратов, блокаторов медленных кальциевых каналов, бета-адреноблокаторов, ганглиоблокаторов, диуретиков (в т.ч. фуросемида, гипотиазида), миотропных спазмолитиков.

Взаимное усиление риска развития побочных эффектов отмечается при одновременном применении с опиоидными анальгетиками.

Адсорбенты, вяжущие, обволакивающие лекарственные средства снижают всасывание препарата в ЖКТ.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном (более 7 дней) применении необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказан: выраженная почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказан: выраженная печеночная недостаточность

Применение в детском возрасте

Протиовопоказан: детский возраст до 8 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Andipal