

[Андипал](#)



Код АТХ:

- [N02BB72](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бендазол](#)
- [Метамизол натрия](#)
- [Папаверин](#)
- [Фенобарбитал](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает вазодилатирующее, анальгезирующее, спазмолитическое и седативное действие.

Показания к применению:

— болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга;

— артериальная гипертензия.

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Гипертензия](#)
- [Спазмы](#)

Противопоказания:

- выраженная почечная/печеночная недостаточность;
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- заболевания крови;
- тахикардия;
- тяжелая стенокардия;
- декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность;
- закрытоугольная глаукома;
- гиперплазия предстательной железы;
- кишечная непроходимость;
- мегаколон;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 8 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, запор, нарушение функции печени.

Со стороны ЦНС: сонливость, снижение скорости психомоторных реакций.

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, агранулоцитоз.

Прочие: аллергические реакции, снижение АД, нарушения функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает гипотензивное действие нитратов, блокаторов медленных кальциевых каналов, бета-адреноблокаторов, ганглиоблокаторов, диуретиков (в т.ч. фуросемида, гипотиазида), миотропных спазмолитиков.

Взаимное усиление риска развития побочных эффектов отмечается при одновременном применении с опиоидными анальгетиками.

Адсорбенты, вяжущие, обволакивающие лекарственные средства снижают всасывание препарата в ЖКТ.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном (более 7 дней) применении необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Андипал

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказан: выраженная почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказан: выраженная печеночная недостаточность

Применение в детском возрасте

Противопоказан: детский возраст до 8 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Andipal>