

[Анестезол](#)



Код АТХ:

- [C05AD03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Висмута субгаллат](#)
- [Рацементол](#)
- [Цинка оксид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Supпозитории ректальные	1 супп.
бензокаин	100 мг
висмута субгаллат	40 мг
цинка оксид	20 мг
ментол	4 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местноанестезирующее, антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие.

Показания к применению:

- геморрой;
- трещины заднего прохода.

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 12 лет.

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника: **взрослым и детям старше 12 лет** - по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Жжение в прямой кишке, слабительный эффект, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять с осторожностью во время беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Срок годности - 3 г . Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Anestezol>