

[Ангидак](#)



Код АТХ:

- [A01AD02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензидамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Спрей для местного применения дозированный** в виде бесцветного или слегка желтоватого прозрачного раствора с характерным запахом мяты.

	1 доза
бензидамина гидрохлорид	0.255 мг

Вспомогательные вещества: этанол 95% - 13.89 мг, глицерол (глицерин) - 8.52 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.17 мг, ароматизатор ментоловый - 0.051 мг, натрия сахаринат - 0.041 мг, натрия гидрокарбонат - 0.019 мг, полисорбат 20 - 0.009 мг, натрия гидроксида раствор 1 М или раствор хлористоводородной кислоты 0.5 М - до pH 5.0-7.0, вода д/и - до 170 мкл.

15 мл (88 доз) - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.

30 мл (176 доз) - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Механизм действия связан с ингибированием фермента ЦОГ и нарушением синтеза простагландинов.

Показания к применению:

Для наружного применения: венозная недостаточность нижних конечностей с проявлениями флебостаза, флебиты и тромбофлебиты поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии), состояния после

склерозирования вен и флебэктомии, постфлебитические синдромы, нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях при беременности.

Для местного применения: воспалительные заболевания полости рта и горла, в качестве дополнительного средства при консервативной терапии после экстракции зуба, после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти), калькулезное воспаление слюнных желез, воспалительные заболевания влагалища.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Воспаление](#)
- [Склерит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Флебит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бензидамину.

Способ применения и дозы:

Наружно и местно применяется 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: сонливость, аллергические реакции.

Местные реакции: чувство жжения, онемение тканей.

При местном применении возможны реакции, связанные с резорбтивным действием.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применять при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях применяют в составе комбинированной терапии.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Angidak>