

## Ангин-Хель СД



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания гомеопатические** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с отдельными желтоватыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, без запаха.

	<b>1 таб.</b>
Hydrargyrum bicyanatum (гидраргирум бицианатум) D8	30 мг
Phytolacca americana (фитолякка американа) D4	30 мг
Apis mellifica (апис мelliфика) D4	30 мг
Arnica montana (арника монтана) D4	30 мг
Hepar sulfuris (гепар сульфурис) D6	60 мг
Atropa bella-donna (атропа белла-донна) D4	60 мг

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

### Показания к применению:

— тонзиллит.

### Относится к болезням:

- [Тонзиллит](#)

### Противопоказания:

— детский возраст (до 3 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства Астровых (Сложноцветных).

## **Способ применения и дозы:**

**Взрослые и дети старше 12 лет** принимают препарат по 1 таб. 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день).

Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Применение препарата у **детей от 3 до 12 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить.

## **Передозировка:**

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39°C, а также при всех неясных или устойчивых симптомах следует обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

### ***Применение в детском возрасте***

Применение препарата у **детей от 3 до 12 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Angin-Hel\\_Sd](http://drugs.thead.ru/Angin-Hel_Sd)