


## [АнгиоНорм](#)



### Код АТХ:

- [C10AX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>	<b>1 таб.</b>
экстракт смеси лекарственного сырья	100 мг,
в т.ч. экстракт семян каштана конского	
в т.ч. экстракт корня солодки голой	
в т.ч. экстракт плодов боярышника	

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
30 шт. - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
30 шт. - пеналы полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Ангионорм обладает выраженной антиагрегантной, антитромбоцитарной активностью, ангиопротекторными и противовоспалительными свойствами, оказывает венотонизирующее и улучшающее микроциркуляцию действие, активизирует диуретическую функцию почек.

Ангионорм оказывает влияние на общее состояние организма: повышает физическую работоспособность, проявляет стресс-протекторную активность и умеренный противоболевой эффект.

### **Показания к применению:**

— в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов (тромбозы, тромбоэмболии), нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции (тромбозы капилляров);

— нарушение венозного кровообращения (варикозное расширение вен, постротромботический синдром, тромбозы вен, тромбозы капилляров).

### **Относится к болезням:**

- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Тромбоэмболия](#)

### **Противопоказания:**

— тяжелые хронические заболевания печени, почек и ЖКТ с нарушением их функций;

— детский возраст;

— беременность;

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Ангионорм принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения до 3-х недель. Возможно увеличение разовой дозы Ангионорма до 2-х таблеток 3 раза в день в случае хорошей переносимости. Необходимость проведения повторного курса определяется врачом.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, диспептические расстройства.

### **Передозировка:**

При длительном применении Ангионорм в дозах, превышающих рекомендованную суточную лечебную дозу, возможно усиление степени выраженности побочных эффектов.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение Ангионорм можно сочетать с другими лекарственными средствами: гиполлипемическими, противовоспалительными, болеутоляющими средствами, антибиотиками, антикоагулянтами прямого и непрямого действия.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

**При нарушениях функции почек**

Противопоказан при тяжелых хронических заболеваниях почек с нарушением их функций.

**При нарушениях функции печени**

Противопоказан при тяжелых хронических заболеваниях печени с нарушением функции.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/AngioNorm>