


АнгиоНорм



Код АТХ:

- [C10AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой	1 таб.
экстракт смеси лекарственного сырья	100 мг,
в т.ч. экстракт семян каштана конского	
в т.ч. экстракт корня солодки голой	
в т.ч. экстракт плодов боярышника	

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
30 шт. - пеналы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ангионорм обладает выраженной антиагрегантной, антитромбоцитарной активностью, ангиопротекторными и противовоспалительными свойствами, оказывает венотонизирующее и улучшающее микроциркуляцию действие, активизирует диуретическую функцию почек.

Ангионорм оказывает влияние на общее состояние организма: повышает физическую работоспособность, проявляет стресс-протекторную активность и умеренный противоболевой эффект.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов (тромбозы, тромбоэмболии), нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции (тромбозы капилляров);

— нарушение венозного кровообращения (варикозное расширение вен, посттромботический синдром, тромбозы вен).

Относится к болезням:

- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Тромбоэмболия](#)

Противопоказания:

- тяжелые хронические заболевания печени, почек и ЖКТ с нарушением их функций;
- детский возраст;
- беременность;
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Ангионорм принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения до 3-х недель. Возможно увеличение разовой дозы Ангионорма до 2-х таблеток 3 раза в день в случае хорошей переносимости. Необходимость проведения повторного курса определяется врачом.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диспептические расстройства.

Передозировка:

При длительном применении Ангионорм в дозах, превышающих рекомендованную суточную лечебную дозу, возможно усиление степени выраженности побочных эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение Ангионорм можно сочетать с другими лекарственными средствами: гиполипидемическими, противовоспалительными, болеутоляющими средствами, антибиотиками, антикоагулянтами прямого и непрямого действия.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых хронических заболеваниях почек с нарушением их функций.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых хронических заболеваниях печени с нарушением функции.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Angionorm>