Анолит Нейтральный Анк



Код АТХ:

- D08AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для местного и наружного применения прозрачный, бесцветный, с легким запахом хлора.

	1 мл
оксиданты гидропероксидные	0.08-0.12 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид раствор 22 %.

400 мл - флаконы.
450 мл - флаконы.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Анолит нейтральный АНК представляет собой водный раствор разведенного раствора натрия хлорида, пропущенный через электрохимический реактор, вырабатывающий хлоркислородные и гидропероксидные оксиданты (хлорноватистая кислота, гипохлорит-ион, соединения активного кислорода).

Анолит нейтральный АНК нетоксичен, обладает высокой реакционной и каталитической активностью при низкой концентрации активно действующих веществ, обеззараживающей активностью, моющими и противовоспалительными свойствами.

Анолит нейтральный АНК ускоряет заживление инфицированных гнойных ран.

Фармакокинетика

Активно действующие вещества Анолита нейтрального АНК при наружном, местном применении не оказывают на организма резорбтивного действия.

Показания к применению:

— обработка кожи, кожных складок, слизистых оболочек с целью обеззараживания и удаления органических загрязнений (пот, выделения сальных желез, иные загрязнения);

— лечение инфицированных ран, профилактика раневой инфекции.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— базелиома в месте предполагаемой обработки;

— рак кожи в месте предполагаемой обработки.

Способ применения и дозы:

Наружно. Местно.

Приготовленный раствор наносят на марлевую салфетку до интенсивного смачивания и прикладывают смоченную в Анолите нейтральном АНК салфетку к обрабатываемому воспаленному или здоровому участку кожи. Время аппликации - 10 -15 минут. Расход Анолита нейтрального АНК при аппликационной терапии составляет 40-70 мл на 1000 $см^2$ кожной поверхности, что соответствует дозе активно действующих веществ от 4 до 7 мг - при пересчете на вес тела человека примерно 0,06-0,1 мг/кг веса за одну аппликацию. После аппликации участок кожи, обработанный Анолитом нейтральным АНК, подсушивают в течение нескольких минут и продолжают лечение другими способами по выбору лечащего врача (сухая стерильная повязка, жировые повязки, мазевые повязки или другие методы). Общее количество аппликаций с анолитом 2-3 раза в день. Продолжительность курса обработки 5-7 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

В случае увеличения времени экспозиции более 15 минут возможно появление раздражения кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не использовать совместно с йодсодержащими антисептиками

Особые указания и меры предосторожности:

Допускается синтез препарата в электрохимических установках типа СТЭЛ ex tempore в условиях операционного блока, перевязочной, процедурной, у постели больного. Приготовленный ex tempore препарат помещается в чистые стерильные емкости и используется по показаниям.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15° до 25°С, в защищенном от света месте Замораживание или нагревание препарата не допускается.

Срок годности - 5 суток от момента изготовления препарата.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anolit_Neytralnyy_Ank