

## [Анти-Ангин Формула \(таблетки\)](#)



### Код АТХ:

- [R02A](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетракаин](#)
- [Хлоргексидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина диацетат	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

## Анти-Ангин Формула (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрат	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрат	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрат	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может оказывать бактерицидное и

бактериостатическое действие, преимущественно, в отношении грамположительных бактерий и *Candida albicans*, и в меньшей мере, против грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli*, *Selenomonas* spp. и анаэробных бактерий. Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus sanguis*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella veillonella*.

Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.

Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.

### Показания к применению:

— профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтоз, начальная стадия ангины, состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др.).

### Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 5 лет;
- I триместр беременности.

*С осторожностью:* во II и III триместрах беременности по назначению врача, период лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.

### Способ применения и дозы:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания.

**Взрослые и дети с 15 лет:** 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа. **Дети с 5 до 10 лет:** 3 таблетки в день с интервалом 4 часа. **Дети с 10 до 15 лет:** 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.

### Побочное действие:

Аллергические реакции.

Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.

### Передозировка:

*Симптомы передозировки:* головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.

*Лечение:* промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано в I триместре беременности. С осторожностью во II и III триместрах, а также в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов. Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина. Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод).

Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.

### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью при гипероксалурии, оксалозе и почечнокаменной болезни.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 5 лет.

## **Условия хранения:**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Anti-Angin\\_Formula\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Anti-Angin_Formula_tabletki)