

[Анти-Ангин Формула \(таблетки\)](#)



Код АТХ:

- [R02A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетракаин](#)
- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	1 таб.
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина диацетат	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

Анти-Ангин Формула (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	1 таб.
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрохлорид	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	1 таб.
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрохлорид	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

	1 таб.
аскорбиновая кислота	50 мг
хлоргексидина дигидрохлорид	2 мг
тетракаина гидрохлорид	200 мкг

2 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

2 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

12 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может оказывать бактерицидное и

бактериостатическое действие, преимущественно, в отношении грамположительных бактерий и *Candida albicans*, и в меньшей мере, против грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli*, *Selenomonas* spp. и анаэробных бактерий. Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus sanguis*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella veillonella*.

Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.

Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.

Показания к применению:

— профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтоз, начальная стадия ангины, состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др.).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 5 лет;
- I триместр беременности.

С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, период лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.

Способ применения и дозы:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания.

Взрослые и дети с 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа. **Дети с 5 до 10 лет:** 3 таблетки в день с интервалом 4 часа. **Дети с 10 до 15 лет:** 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.

Передозировка:

Симптомы передозировки: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.

Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано в I триместре беременности. С осторожностью во II и III триместрах, а также в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов. Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина. Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод).

Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.

При нарушениях функции почек

С осторожностью при гипероксалурии, оксалозе и почечнокаменной болезни.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 5 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anti-Angin_Formula_tabletki