АнтиФлу Кидс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Парацетамол
- Хлорфенамин
- Аскорбиновая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь*** белый с незначительными оттенками, сыпучий, включающий кристаллические частицы, со слабым запахом малины; приготовленный раствор бледно-розового цвета, непрозрачный, со слабым запахом малины.

	1 пак.
парацетамол	160 мг
аскорбиновая кислота	50 мг
хлорфенамина малеат	1 мг

Вспомогательные вещества: лимонная кислота - 50 мг, краситель красный очаровательный - 0.05 мг, ароматизатор малиновый - 100 мг, кремния диоксид (силлоид) - 4 мг, кремния диоксид - 20 мг, натрия цитрат трехосновной - 2 мг, крахмал кукурузный - 1 мг, сахарная пудра - 2794.95 мг, сахароза - 8800 мг, титана диоксид - 1 мг, кальция фосфат трехосновной - 1 мг.

12 г - пакетики из ламинированной фольги (5) - пачки картонные.
12 г - пакетики из ламинированной фольги (8) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для симптоматической терапии ОРЗ и простудных заболеваний.

Парацетамол - анальгетик-антипиретик, оказывает анальгезирующий, жаропонижающий и слабый противовоспалительный эффект.

Аскорбиновая кислота (витамин С) повышает сопротивляемость организма к инфекциям, улучшает переносимость парацетамола.

Хлорфенамина малеат - блокатор гистаминовых H_1-рецепторов, обладает противоаллергическим действием, устраняет симптомы ринита, слезотечение, зуд в глазах и в носу.

Препарат быстро уменьшает жар, головную и мышечную боль, боль в горле, симптомы ринита.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Антифлу Кидс не предоставлены.

Показания к применению:

— для облегчения симптомов гриппа и простудных заболеваний у детей в возрасте 2 лет и старше.

Противопоказания:

— выраженные нарушения функции печени;

— выраженные нарушения функции почек;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь независимо от приема пищи.

Разовая доза для **детей в возрасте 2-5 лет** составляет содержимое 1 пакетика, для **детей в возрасте 6-12 лет** - содержимое 2 пакетиков. При необходимости можно повторять прием каждые 4-6 ч, но не более 3 доз в течение суток. Максимальная длительность лечения составляет 5 дней. Необходимость более длительного применения препарата врач определяет индивидуально.

При приеме следует предварительно растворить содержимое пакета в 150 мл теплой воды.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: редко - сонливость, замедление реакции.

Со стороны пищеварительной системы: редко - боль в области желудка, тошнота, рвота, диарея.

Прочие: редко - нарушения кроветворения, у предрасположенных лиц - аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: нарушения функций печени и почек.

Лечение: отмена препарата, проведение симптоматической и поддерживающей терапии под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется применять препарат одновременно со снотворными, успокоительными средствами и с препаратами, содержащими этанол.

Особые указания и меры предосторожности:

Учитывая способность препарата вызывать сонливость, следует в течение 4 ч после приема препарата освобождать детей от занятий, требующих повышенной концентрации внимания.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение при выраженных нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказано применение при выраженных нарушениях функции печени.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей в возрасте 2 лет и старше согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 15° до 30°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/AntiFlu_Kids