# Антиоксикапс с цинком



## Код АТХ:

- A11AA04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые, продолговатой формы со швом, упругие, красного цвета; содержимое капсул - однородная масляная суспензия красного цвета с маслянистым непрогорклым запахом и вкусом.

| | **1 капс.** |
|---|---|
| бетакаротен (вит. А) | 6 мг |
| α-токоферола ацетат (вит. Е) | 30 мг |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 100 мг |
| цинка оксид | 10 мг |
| в т.ч. цинк | 8 мг |

*Вспомогательные вещества:* масло кукурузное, масло подсолнечное рафинированное, масло соевое гидратированное, воск пчелиный, лецитин очищенный.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комплекс витаминов с микроэлементом. Действие препарата обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов: кислоты аскорбиновой (витамин С), α-токоферола ацетата (витамин Е), бетакаротена (провитамин А) и цинка.

***Фармакокинетика***

Действие препарата Антиоксикапс с цинком является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

## Показания к применению:

— для профилактики гипо- и авитаминозов (A, C и E) и дефицита ионов цинка в организме;

— для повышения активности факторов неспецифической защиты организма;

— повышенные физические и умственные нагрузки;

— период восстановления после продолжительных или тяжело протекавших заболеваний (в т.ч. инфекционных);

— астенические состояния различной этиологии;

— в составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома и никотиновой зависимости;

— несбалансированное и неполноценное питание.

## Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Инфекции
- Никотиновая зависимость

## Противопоказания:

— детский возраст до 14 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При применении Антиоксикапс с цинком в *профилактических целях* препарат назначают **взрослым и детям старше 14 лет** по 1 капсуле 1 раз/сут. Курс - 1-3 мес. Проведение повторных курсов по рекомендации врача.

При применении Антиоксикапс с цинком в *лечебных целях* по соответствующим показаниям дозу препарата устанавливает врач в зависимости от клинической ситуации и с учетом потребности пациента в витаминах и микроэлементах.

Препарат следует принимать после еды, запивая водой.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

*При длительном применении в высоких дозах:* анемия, развитие симптомов дефицита меди.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Антиоксикапс с цинком не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата Антиоксикапс с цинком при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата с ГКС, антибиотиками из группы тетрациклинов, а также этанолом и этанолсодержащими препаратами снижается терапевтический эффект провитамина А.

Токоферол может повышать эффективность противосудорожных средств у пациентов с эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов.

Не рекомендуется применять одновременно в другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.

## Особые указания и меры предосторожности:

На фоне применения препарата Антиоксикапс с цинком следует избегать употребления молочных продуктов, т.к. при этом может нарушиться всасывание солей цинка из пищеварительного тракта.

На фоне применения препарата не следует употреблять алкоголь.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 14 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Antioksikaps_s_cinkom