

[Антиоксикапс с цинком](#)



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** мягкие желатиновые, продолговатой формы со швом, упругие, красного цвета; содержимое капсул - однородная масляная суспензия красного цвета с маслянистым непрогорклым запахом и вкусом.

	1 капс.
бетакаротен (вит. А)	6 мг
α-токоферола ацетат (вит. Е)	30 мг
аскорбиновая кислота (вит. С)	100 мг
Цинка оксид	10 мг
в т.ч. цинк	8 мг

Вспомогательные вещества: масло кукурузное, масло подсолнечное рафинированное, масло соевое гидратированное, воск пчелиный, лецитин очищенный.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплекс витаминов с микроэлементом. Действие препарата обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов: кислоты аскорбиновой (витамин С), α-токоферола ацетата (витамин Е), бетакаротена (провитамин А) и цинка.

Фармакокинетика

Действие препарата Антиоксикапс с цинком является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания к применению:

- для профилактики гипо- и авитаминозов (А, С и Е) и дефицита ионов цинка в организме;
- для повышения активности факторов неспецифической защиты организма;
- повышенные физические и умственные нагрузки;
- период восстановления после продолжительных или тяжело протекавших заболеваний (в т.ч. инфекционных);
- астенические состояния различной этиологии;
- в составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома и никотиновой зависимости;
- несбалансированное и неполноценное питание.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Инфекции](#)
- [Никотиновая зависимость](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 14 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При применении Антиоксикапс с цинком в *профилактических целях* препарат назначают **взрослым и детям старше 14 лет** по 1 капсуле 1 раз/сут. Курс - 1-3 мес. Проведение повторных курсов по рекомендации врача.

При применении Антиоксикапс с цинком в *лечебных целях* по соответствующим показаниям дозу препарата устанавливает врач в зависимости от клинической ситуации и с учетом потребности пациента в витаминах и микроэлементах.

Препарат следует принимать после еды, запивая водой.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

При длительном применении в высоких дозах: анемия, развитие симптомов дефицита меди.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Антиоксикапс с цинком не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата Антиоксикапс с цинком при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата с ГКС, антибиотиками из группы тетрациклинов, а также этанолом и этанолсодержащими препаратами снижается терапевтический эффект провитамина А.

Токоферол может повышать эффективность противосудорожных средств у пациентов с эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов.

Не рекомендуется применять одновременно в другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне применения препарата Антиоксикапс с цинком следует избегать употребления молочных продуктов, т.к. при этом может нарушиться всасывание солей цинка из пищеварительного тракта.

На фоне применения препарата не следует употреблять алкоголь.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 14 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Antioksikaps_s_cinkom