

## [Антралив](#)



### Код АТХ:

- [A05C](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фосфолипиды](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Гепатопротекторное средство, входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и митохондрий. Регулирует липидный и углеводный обмен, улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

### Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- гепатит (острый и хронический);
- жировая дистрофия печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);
- токсический гепатит;
- алкогольный гепатит;
- цирроз печени;
- печеночная кома;
- гестоз;
- лучевая болезнь;
- псориаз;

## Антралив

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- отравления, лекарственная интоксикация;
- нарушение функции печени при других соматических заболеваниях.

### Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Гестоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Кома](#)
- [Печеночная кома](#)
- [Псориаз](#)
- [Сахарный диабет](#)
- [Цирроз печени](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность.

### Способ применения и дозы:

В начале лечения желательно комбинировать парентеральное введение с приемом внутрь, по мере улучшения состояния больного лечение продолжают капсулами.

В/в, по 0.5-1 г 2-3 раза/сут (лучше капельно, со скоростью 40-50 кап/мин, растворяя в 250-300 мл 5% раствора декстрозы, или в/в струйно, предварительно развести кровью пациента в соотношении 1:1).

Внутрь, по 600 мг 2-3 раза/сут во время еды, с небольшим количеством воды. Курс лечения - 3 мес, при необходимости может быть продолжен или повторен.

При *псориазе* начинают с 2-недельного приема капсул (по 600 мг 3 раза/сут), затем проводится 10 в/в вливаний по 250 мг ежедневно и одновременно начинается ПУВА-терапия. После завершения вливаний возобновляют прием капсул на протяжении 2 мес. При наличии противопоказаний к ПУВА-терапии ограничиваются применением препарата по приведенной методике, в т.ч. в сочетании с общепринятыми методами лечения псориаза.

### Побочное действие:

Тошнота, гастралгия, аллергические реакции.

### Особые указания и меры предосторожности:

Для приготовления растворов для в/в введения нельзя применять растворы электролитов. Парентерально следует вводить только прозрачные растворы.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Antraliv>