Антралив



Код АТХ:

- A05C

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фосфолипиды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротекторное средство, входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и митохондрий. Регулирует липидный и углеводный обмен, улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— гепатит (острый и хронический);

— жировая дистрофия печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);

— токсический гепатит;

— алкогольный гепатит;

— цирроз печени;

— печеночная кома;

— гестоз;

— лучевая болезнь;

— псориаз;

— отравления, лекарственная интоксикация;

— нарушение функции печени при других соматических заболеваниях.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Гестоз
- Интоксикация
- Инфекции
- Кома
- Печеночная кома
- Псориаз
- Сахарный диабет
- Цирроз печени

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

В начале лечения желательно комбинировать парентеральное введение с приемом внутрь, по мере улучшения состояния больного лечение продолжают капсулами.

В/в, по 0.5-1 г 2-3 раза/сут (лучше капельно, со скоростью 40-50 кап/мин, растворяя в 250-300 мл 5% раствора декстрозы, или в/в струйно, предварительно развести кровью пациента в соотношении 1:1).

Внутрь, по 600 мг 2-3 раза/сут во время еды, с небольшим количеством воды. Курс лечения - 3 мес, при необходимости может быть продолжен или повторен.

При *псориазе* начинают с 2-недельного приема капсул (по 600 мг 3 раза/сут), затем проводится 10 в/в вливаний по 250 мг ежедневно и одновременно начинается ПУВА-терапия. После завершения вливаний возобновляют прием капсул на протяжении 2 мес. При наличии противопоказаний к ПУВА-терапии ограничиваются применением препарата по приведенной методике, в т.ч. в сочетании с общепринятыми методами лечения псориаза.

Побочное действие:

Тошнота, гастралгия, аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Для приготовления растворов для в/в введения нельзя применять растворы электролитов. Парентерально следует вводить только прозрачные растворы.

Источник: http://drugs.thead.ru/Antraliv