Анузол



Код АТХ:

- C05AX04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Белладонны листьев экстракт
- Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс
- Цинка сульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории*** зеленовато-желтого с коричневатым оттенком или светло-коричневого цвета, с запахом ксероформа.

	1 супп.
висмута трибромфенат (ксероформ)	100 мг
густой экстракт красавки	20 мг
цинка сульфат	50 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению:

— геморрой;

— трещины заднего прохода.

Относится к болезням:

- Геморрой

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— атония кишечника;

— сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

— тахиаритмия;

— миастения;

— закрытоугольная глаукома;

— аденома предстательной железы;

— беременность;

— лактация.

Способ применения и дозы:

Ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза препарата - 7 суппозиториев.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, запор, послабление стула, сердцебиение, расширение зрачков, преходящие нарушения зрения (парез аккомодации), головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочеиспускания, снижение потоотделения, гипертермия.

Лечение: следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять в период деятельности, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций (управление транспортными средствами, работа на станках и др.).

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°С.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anuzol