

## [Анузол](#)



### Код АТХ:

- [C05AX04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны листьев экстракт](#)
- [Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс](#)
- [Цинка сульфат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суппозитории** зеленовато-желтого с коричневатым оттенком или светло-коричневого цвета, с запахом ксероформа.

|                                  | <b>1 супп.</b> |
|----------------------------------|----------------|
| висмута трибромфенат (ксероформ) | 100 мг         |
| густой экстракт красавки         | 20 мг          |
| цинка сульфат                    | 50 мг          |

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

### Показания к применению:

- геморрой;
- трещины заднего прохода.

## Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- атония кишечника;
- сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- тахикардия;
- миастения;
- закрытоугольная глаукома;
- аденома предстательной железы;
- беременность;
- лактация.

## Способ применения и дозы:

Ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза препарата - 7 суппозиториев.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, запор, послабление стула, сердцебиение, расширение зрачков, преходящие нарушения зрения (парез аккомодации), головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочеиспускания, снижение потоотделения, гипертермия.

*Лечение:* следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять в период деятельности, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций (управление транспортными средствами, работа на станках и др.).

## Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Анузол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Anuzol>