

[Анузол](#)



Код АТХ:

- [C05AX04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны листьев экстракт](#)
- [Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс](#)
- [Цинка сульфат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории** зеленовато-желтого с коричневатым оттенком или светло-коричневого цвета, с запахом ксероформа.

| | 1 супп. |
|----------------------------------|----------------|
| висмута трибромфенат (ксероформ) | 100 мг |
| густой экстракт красавки | 20 мг |
| цинка сульфат | 50 мг |

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению:

- геморрой;
- трещины заднего прохода.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- атония кишечника;
- сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- тахикардия;
- миастения;
- закрытоугольная глаукома;
- аденома предстательной железы;
- беременность;
- лактация.

Способ применения и дозы:

Ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза препарата - 7 суппозиториев.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, запор, послабление стула, сердцебиение, расширение зрачков, преходящие нарушения зрения (парез аккомодации), головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочеиспускания, снижение потоотделения, гипертермия.

Лечение: следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять в период деятельности, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций (управление транспортными средствами, работа на станках и др.).

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Анузол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Anuzol>