

[Апилак](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Маточное молочко](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Биогенный стимулятор. Обладает общетонизирующим действием, стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

Показания к применению:

Для приема внутрь: гипотрофия и анорексия, хронические расстройства пищеварения различной этиологии у грудных детей и детей до 3 лет, нарушения лактации и кровопотери в послеродовом периоде; артериальная гипотензия различного генеза, период реконвалесценции, климактерический период у женщин, снижение потенции у мужчин, связанное с переутомлением, неврозом, мужским климаксом.

Для наружного применения: себорея кожи лица, себорейная и микробная экзема, нейродермит, зудящие дерматозы, опрелости.

Относится к болезням:

- [Гипотензия](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Нейродермит](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

Болезнь Аддисона, повышенная чувствительность к маточному молочку.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, нарушения сна.

При местном применении: ощущение инородного тела в глазу, отек и гиперемия глаз.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии аллергических реакций лечение следует прекратить.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Apilak>