Апилак Гриндекс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Маточное молочко

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** плоскоцилиндрические, на поверхности и в изломе белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с мелкими желтыми вкраплениями.

	1 таб.
апилак лиофилизированный (порошок нативного маточного молочка пчел)	10 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный.

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
25 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с общеукрепляющим действием. Представляет собой пчелиное маточное молочко - секрет, вырабатываемый аллотрофическими железами рабочих пчел.

В Апилаке содержатся витамины (в т.ч. аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, пиридоксин, цианокобаламин, биотин, фолиевая кислота, инозитол), макроэлементы (K, Na, Ca, Mg, Fe, P) и

микроэлементы (Zn, Mn, Cu, Co, S, Si, Ni, Cr, As, Bi), 23 различные аминокислоты, включая незаменимые (в т.ч. гистидин, валин, метионин, триптофан); другие биологически активные вещества (в т.ч. холинэстераза, ацетилхолин).

Препарат обладает общетонизирующим действием, стимулирует клеточный метаболизм.

Фармакокинетика

Действие препарата Апилак является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний;

— при нарушении лактации в послеродовом периоде;

— в качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии.

Относится к болезням:

- Гипотензия
- Неврит
- Неврозы
- Реконвалесценция

Противопоказания:

— болезнь Аддисона;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства.

Способ применения и дозы:

Принимают сублингвально.

Взрослым по 10 мг (1 таб.) 3 раза/сут в течение 10-15 дней.

Таблетку следует положить под язык и держать до полного рассасывания.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, нарушения сна.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Апилак отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости и в соответствии с показаниями препарат можно применять при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Апилак не наблюдалось.

Особые указания и меры предосторожности:

При появлении аллергических реакций необходимо прекратить прием препарата.

При нарушениях сна следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Apilak_Grindeks