

[Апилак Гриндекс \(мазь\)](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Маточное молочко](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 3%** белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом коричневого спирта (гиацинта).

	1 г
апилак лиофилизированный (порошок нативного маточного молочка пчел)	10 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, цетиловый спирт, парафин твердый, глицерол, спирт коричный, метил парагидроксibenзоат, натрия цетилстеарилсульфат, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения для наружного применения. Стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

Фармакокинетика

Действие мази Апилак является результатом совокупного действия компонентов препарата, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата

Показания к применению:

- себорея кожи лица;
- кожный зуд;
- опрелость.

Относится к болезням:

- [Зуд](#)
- [Себорея](#)

Противопоказания:

- болезнь Аддисона;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи (непосредственно или под повязку) 1-2 раза/сут.

При себорее кожи лица мазь рекомендуется наносить 1 раз/сут.

Длительность лечения определяется индивидуально, в зависимости от характера заболевания, эффективности лечения, и составляет от 1 недели до 2 месяцев.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожные проявления (в т.ч. зуд, покраснение кожи).

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Апилак в форме мази отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости препарат можно применять при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие мази Апилак не наблюдалось.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии побочных эффектов пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 15°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Apilak_Grindeks_maz