

## [Апилак Гриндекс \(мазь\)](#)



### Код АТХ:

- [A13A](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Маточное молочко](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 3%** белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом коричневого спирта (гиацинта).

	<b>1 г</b>
апилак лиофилизированный (порошок нативного маточного молочка пчел)	10 мг

*Вспомогательные вещества:* вазелин, цетиловый спирт, парафин твердый, глицерол, спирт коричный, метил парагидроксibenзоат, натрия цетилстеарилсульфат, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат биологического происхождения для наружного применения. Стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

#### **Фармакокинетика**

Действие мази Апилак является результатом совокупного действия компонентов препарата, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата

## **Показания к применению:**

- себорея кожи лица;
- кожный зуд;
- опрелость.

## **Относится к болезням:**

- [Зуд](#)
- [Себорея](#)

## **Противопоказания:**

- болезнь Аддисона;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства.

## **Способ применения и дозы:**

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи (непосредственно или под повязку) 1-2 раза/сут.

При себорее кожи лица мазь рекомендуется наносить 1 раз/сут.

Длительность лечения определяется индивидуально, в зависимости от характера заболевания, эффективности лечения, и составляет от 1 недели до 2 месяцев.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* кожные проявления (в т.ч. зуд, покраснение кожи).

## **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Апилак в форме мази отсутствуют.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При необходимости препарат можно применять при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие мази Апилак не наблюдалось.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При развитии побочных эффектов пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 15°С.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Apilak\\_Grindeks\\_maz](http://drugs.thead.ru/Apilak_Grindeks_maz)