

## [Апилака Таблетки 0,01 Г](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Биогенный стимулятор. Обладает общетонизирующим действием, стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

### **Показания к применению:**

Для приема внутрь: гипотрофия и анорексия, хронические расстройства пищеварения различной этиологии у грудных детей и детей до 3 лет, нарушения лактации и кровопотери в послеродовом периоде; артериальная гипотензия различного генеза, период реконвалесценции, климактерический период у женщин, снижение потенции у мужчин, связанное с переутомлением, неврозом, мужским климаксом.

Для наружного применения: себорея кожи лица, себорейная и микробная экзема, нейродермит, зудящие дерматозы, опрелости.

### **Относится к болезням:**

- [Гипотензия](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Нейродермит](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

### **Противопоказания:**

Болезнь Аддисона, повышенная чувствительность к маточному молочку.

### **Способ применения и дозы:**

## **Апилака Таблетки 0,01 Г**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Индивидуальный, в зависимости от применяемой лекарственной формы.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции, нарушения сна.

*При местном применении:* ощущение инородного тела в глазу, отек и гиперемия глаз.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При развитии аллергических реакций лечение следует прекратить.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Apilaka\\_Tabletki\\_001\\_G](http://drugs.thead.ru/Apilaka_Tabletki_001_G)