Апизартрон



Код АТХ:

- M02AC

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** от белого до слегка желтоватого цвета, однородной консистенции, с запахом метилсалицилата.

	100 г
яд пчелиный	3 мг
метилсалицилат	10 г
аллилизотиоцианат	1 г

Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 700 мг, вазелин белый - 6 г, эмульгированный цетостеариловый спирт - 14 мг (натрия цетилстеарилсульфат - 1.4 г, цетостеариловый спирт - 12.6 г), вода - до 100 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат на основе пчелиного яда для наружного применения.

Оказывает местное раздражающее действие благодаря стимуляции периферических нервных окончаний. Оказывает прямое сосудорасширяющее действие, что приводит к улучшению снабжения тканей кислородом; ускоряет распад вызывающих боль продуктов обмена веществ. Метилсалицилат и аллилизотиоцианат вызывают гиперемию кожи, оказывают анальгезирующий и разогревающий эффекты.

Апизартрон способствует активизации обмена веществ, повышению эластичности соединительной ткани и мышц, понижению тонуса мышц.

Действие развивается через несколько минут после нанесения препарата на область поражения.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Апизартрон не предоставлены.

Показания к применению:

— заболевания опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, ревматическое поражение мягких тканей);

— артралгии (в т.ч. ревматические заболевания суставов);

— миалгии (в т.ч. связанные с перенапряжением);

— невралгии (в т.ч. невриты, ишиас);

— нарушения периферического кровообращения;

— болевой синдром при мягких поражениях мышц, сухожилий, связок, при ушибах и растяжениях;

— для разогревания мышц до и во время спортивных нагрузок.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Ишиас
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Растяжение
- Ревматизм
- Ревматические заболевания
- Ушиб

Противопоказания:

— хроническая почечная недостаточность тяжелой степени;

— тяжелые заболевания печени;

— заболевания кожи;

— новообразования;

— угнетение костномозгового кроветворения;

— психические заболевания;

— острый артрит;

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к пчелиному яду, салицилатам, изотиацианатам.

Способ применения и дозы:

Полоску мази длиной 3–5 см распределяют в области поражения до слоя толщиной примерно 1 мм и оставляют на 2–3 мин (в зависимости от реактивной способности организма) до появления реакции на нанесение препарата (покраснение, чувство тепла). Затем медленно и интенсивно втирают мазь в кожу. Для усиления лечебного действия рекомендуется держать обработанные области тела в тепле. Как правило, мазь Апизартрон применяют 2–3 раза/сут до исчезновения симптомов заболеваний.

После нанесения Апизартрона руки следует тщательно вымыть водой с мылом.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, зуд в области нанесения мази.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Апизартрон не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение мази Апизартрон при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Апизартрон не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует наносить на поврежденную и раздраженную кожу, а также на участки, пораженные кожным заболеванием.

У пациентов с почечной недостаточностью Апизартрон не следует применять на обширных поверхностях кожи в течение длительного времени.

Не допускать контакта мази с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности тяжелой степени.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Препарт противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Препарат не следует использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Apizartron